

## **Percepcija perifernih tjelesnih promjena kod doživljavanja različitih emocija**

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Filozofski fakultet

Rimé, Philippot i Cisamolo(1990) provjeravaju mogućnost da ispitanici, iako misle da izvještavaju o vlastitim samoprocjenama, opise ustvari temelje na socijalnoj shemi u koju je uključeno znanje o emocionalnim stanjima. Njihovi rezultati upućuju da se ono što ispitanici opisuju kao perifernu promjenu tijekom prave emocionalne epizode ne razlikuje od sterotipa koji definiraju periferne promjene u emocijama. Oni se oslanjaju na socijalnu shemu, koja je odmah dostupna i automatski aktivirana(Devine,1989), a ne na epizodičko pamćenje koje zahtjeva svjestan i voljni trud(Tulving,1984; oba prema Rimé, Philippot i Cisamolo,1990).

### **PROBLEM**

1. Ispitati postoji li razlika izme u zastupljenosti pojedinih dijelova tijela pri pojedinim emocijama
2. Ispitati razlikuju li se pojedine emocije obzirom na perifernu lokaciju

### **METODA**

Ispitanici U istraživanju je sudjelovalo 52 studenata psihologije ( $M=7$ ,  $\bar{Z}=45$ ) Filozofskog fakulteta u Rijeci akademske godine 2004./2005., prosječne dobi 20 godina.

Pribor U istraživanju je korišteno 5 protokola, a na svakom protokolu su bila 2 prikaza ljudskog tijela (glezano sprijeda i gledano straga)

Postupak Zadatak ispitanika bio je na svakom od protokola lokalizirati periferne promjene koje se odnosne na pojedinu emociju. Ispitanicima su prvo podijeljeni protokoli, a zatim im je pročitana uputa. Ispitanicima je rečeno da se pokušaju dosjetiti situacija u kojima su doživjeli 5 emocija (ljutnja, radost, tuga, strah i ga enje) kako bi mogli što detaljnije 2

lokalizirati periferne promjene pri svakoj od emocija. Radi kasnije obrade rezultata na svaki od protokola je bilo potrebno napisati na koju se emociju odnose. Vrijeme potrebno za dosjećanje emocija nije bilo ograničeno, kao ni vrijeme za lokalizaciju područja na kojima dolazi do perifernih promjena. Kada su svi ispitanici lokalizirali periferne promjene pojedine emocije, prešlo se na lokalizaciju iduće emocije.

### **REZULTATI**

Dijelovi tijela koje su ispitanici označavali prilikom lokalizacije perifernih promjena podijeljeni su u pet kategorija : glavu, vrat, trup-gornji dio, trup-donji dio i udove. Dobiveni rezultati nalaze se u Tablici 1.

Tablica 1.Frekvencija pojedinih emocija za pojedini dio tijela DIO TIJELA Glava Vrat Trup – gornji dio Trup- donji dio Udovi  $\Sigma$  Ljutnja 49 19 42 29 46 185 EMOCIJA Radost Tuga Strah 48 51 36 17 24 24 50 50 46 36 30 42 36 22 46 187 177 194 Ga enje 40 36 30 50 21 177  $\Sigma$  224 120 218 187 171 920

Dobivene frekvencije grafički su prikazane na slikama 1. i 2.

Slika 1. Frekvencije pojedinih emocija obzirom na njihovu zastupljenost u pojedinim dijelovima tijela 60 50 40 30 20 10 0 glava vrat trup - gornji dio trup - donji dio udovi dijelovi tijela ljutnja radost tuga strah ga enje

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)**